

Samtidig annan vaccination

Läkemedelsverkets rekommendation 2009-11-20:

- Vaccin mot säsongsinfluensa kan ges samtidigt med Pandemrix i alla åldrar.
- Andra avdödade vacciner kan också ges samtidigt med Pandemrix om så är nödvändigt.
- Avdödade vacciner som ingår i barnvaccinationsprogrammet bör dock helst ges med två veckors intervall före eller efter Pandemrix, när så är möjligt då en viss risk för ökade biverkningar finns, och att det annars blir omöjligt att vid eventuella biverkningar avgöra vilket vaccin som orsakat reaktionen.
- Levande vacciner bör, som tidigare rekommenderats, ges med ett intervall på fyra veckor före eller efter Pandemrix för att undvika påverkan på immunsvaren.
- Om två vacciner ges samtidigt bör det ske i olika extremiteter.

Säsongsinfluensa

Vaccination mot säsongsinfluensan (Fluarix) kan ges redan nu till ålderspensionärer som inte tillhör någon medicinsk riskgrupp.

Om situationen i Sverige kommer att likna den som varit på södra halvklotet kommer under de närmaste månaderna de flesta som insjuknar i influensa att ha den pandemiska influensan, men vi kommer också att se en del fall med säsongsinfluensa.

Vaccinleverantören GlaxoSmithKline (GSK) har genomfört kliniska studier där vaccin mot pandemisk influensa och vaccin mot vanlig säsongsinfluensa kan ges samtidigt men på olika administreringsställen.

Riskgrupper för säsongsinfluensa

Det är aktuellt att på samma sätt som tidigare år se till att de som är riskgrupper för säsongsinfluensa (se SOSFS 1997:21) blir vaccinerad mot denna sjukdom även i år.

Säsongsinfluensavaccinet

Årets upphandlade vaccin mot säsongsinfluensa heter Fluarix® och kommer från GlaxoSmithKline (GSK). Beställningsblankett finns nu på [Smittskyddsenhetens hemsida](#).