

Åtgärder vid tarminfektioner

<i>Agens</i>	<i>Smittkälla</i>	<i>Behandling</i>	<i>Bärarskap</i>	<i>Kontrollodling</i>	<i>Riskyrike</i>	<i>Barn / omsorg</i>	<i>Smittskyddsanmälan</i>
Amöba	Livsmedel Vatten	Beh med antibiotika.	Månader--år.	2 kontroll prov; 2 v efter avslutad beh.	Återgå vid symtomfrihet	Återgå vid symtomfrihet.	Gäller endast Entamoeba histolytica, ej Entamoeba dispar. Alltid, samt skriftlig info till pat.
Giardia	Livsmedel Vatten Person-person	Beh med antibiotika.	Månader--år.	Endast på barn. 2 kontroll prov; 2 v efter avslutad beh.	Återgå vid symtomfrihet.	Återgå vid symtomfrihet.	Alltid, samt skriftlig info till pat.
Campylobakter	Livsmedel Vattendrag Djur	Ej antibiotika	Ca 3 veckor	Behövs ej.	Återgå vid symtomfrihet	Återgå vid symtomfrihet.	Alltid, samt skriftlig info till pat.
EHEC	Livsmedel Person-person Djur	Antibiotika skall undvikas.	2-4 veckor.	Endast på barn och personer med riskyrken.	Återgå efter 1 neg F-odl	Återgå efter 1 neg F-odl.	Alltid, samt skriftlig info till pat Vid inhemsk EHEC - Kontakta smittskyddsenheten
Salmonella	Livsmedel Djur	Återhållsamhet med antibiotika - förlänger bärarskapet.	Vuxna - cirka 8 veckor. Barn -- månader	1 neg F-odl efter 8 v, om restriktioner givits.	Omplacering. Återgå efter 3 neg F-odl.	Återgå vid symtomfrihet. Innan återgång --> noggrann hygien info till daghem.	Alltid, samt skriftlig info till pat Vid inhemsk salmonella - Kontakta smittskyddsenheten
S.Typhi S.Paratyphi	Livsmedel Person-person	Beh med antibiotika.	5-6 veckor. Kron bärarskap - 2-5 % av fallen.	3 neg F-odl. F-odl påbörjas 1 vecka efter beh.	Återgå efter 5 neg F-odl.	Återgå efter 3 neg F-odl.	Alltid, samt skriftlig info till pat Alltid kontakt med Smittsk.läkare / Infektions.läk
Shigella	Livsmedel Person-person	Beh med antibiotika.	Upphör efter beh.	Endast på barn och personer med riskyrken.	Återgå efter 3 neg F-odl.	Återgå efter 3 neg F-odl.	Alltid, samt skriftlig info till pat Vid inhemsk shigella - Kontakta Smittskyddsenheten
Yersinia	Livsmedel	Sällan nödvändigt.	2 v -- 4 mån.	Behövs ej.	Återgå vid symtomfrihet.	Återgå vid symtomfrihet.	Alltid, samt skriftlig info till pat.
Calicivirus <i>OBS! Mycket smittsamt.</i>	Person-person Livsmedel	Symtomatisk	2 dygn	Behövs ej.	Återgå efter 2 symtomfria dygn	Återgå efter 2 symtomfria dygn	Vid större utbrott av " Vinterkräksjuka " - Kontakta smittskyddsenheten
Rotavirus <i>Drabbar fr.a barn 6 mån - 2 år</i>	Person-person	Symtomatisk	~ 8 dygn	Behövs ej.	Ovanligt hos vuxna	Återgå vid symtomfrihet.	Vid större utbrott - Kontakta smittskyddsenheten