

EHEC

Allmänfarlig sjukdom

Infektion med Enterohemorragisk Escherichia coli

Du är, eller misstänks vara, smittad av tarmbakterien EHEC (Enterohemorrhagisk E. coli). Vanligen kommer smittan från mat eller dryck. Smitta kan också överföras vid kontakt med djur. Köttfärs, opastöriserad mjölk, grönsaker & vatten är exempel på livsmedel som kan vara förorenade med avföring från t.ex. nötboskap. EHEC-bakterier tål inte höga temperaturer varför upphettning av mat och dryck kan förhindra smitta.

Sjukdom vid EHEC brukar domineras av diarré, som kan vara blodig. Magkramp är vanligt liksom illamående och kräkningar. En del får inga eller enbart lindriga symtom. Vanligen upphör symtomen inom 1 vecka. Den akuta infektionen ska ej behandlas med antibiotika. Ibland kan sjukdomen kompliceras av skador i blodkärl och njurar. I dessa fall krävs vård på sjukhus.

EHEC-bakterierna finns i tarmen och kan smitta från person till person via orena händer efter toalettbesök eller liknande. Noggrann handhygien är viktig för att undvika smittspridning. Du smittar mest då du har diarré. Så länge du har symtom från mag-tarmkanalen ska du inte arbeta.

EHEC-bakterien kan finnas i tarmen efter att symtomen upphört. Om du arbetar med oförpackade livsmedel, inom vård eller omsorg med spädbarn eller patienter med nedsatt immunförsvar, får du inte återgå i arbete förrän prov visat att du är smittfri eller din doktor bedömt att Du inte är smittsam.

Råd för att förhindra smittspridning

- Tvätta händerna noga efter toalettbesök och före måltid.
- Använd flytande eller egen tvål.
- Använd egen eller engångshandduk.
- Det är bra om du kan ha egen toalett.
- Håll toaletterummet väl städad.
- Var noga med handhygien efter blöjbyten. Använd blöja paketeras i plastpåse.
- Undvik karbad - duscha istället.
- Du bör inte laga mat eller hantera mat åt andra, inte ens i din familj.

Bindande förhållningsregler

- Smittsamt barn skall ej vara på daghem.
- Arbetar du med livsmedel, skall du informera din arbetsgivare om smittan.
- Du får inte yrkesmässigt hantera oförpackade livsmedel eller vårda spädbarn eller patienter med nedsatt immunförsvar förrän du smittfriförklarats.
- Du måste komma på de återbesök och lämna de kontrollprover som din läkare bedömer nödvändiga.

EHEC är allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Du är därför skyldig att följa de förhållningsregler din läkare ger. Om du begär det skall smittskyddsläkaren pröva förhållningsreglerna.

BORÅS
Smittskyddsenheten
Södra Älvsborgs Sjukhus
501 82 Borås
Tfn 033 – 616 29 01
Fax 033 – 616 29 07

GÖTEBORG
Smittskyddsenheten
Kaserntorget 11 B
411 18 Göteborg
Tfn 031 – 368 56 00
Fax 031 – 13 37 95

SKÖVDE
Smittskyddsenheten
Kärnsjukhuset
541 85 Skövde
Tfn 0500 – 43 24 30
Fax 0500 – 43 24 99

UDDEVALLA
Smittskyddsenheten
Uddevalla Sjukhus
451 80 Uddevalla
Tfn 0522 – 934 90
Fax 0522 – 934 46

E-post
smittskydd@vregion.se

Hemsida
www.vregion.se/smittskydd