

Klamydia

Allmänfarlig sjukdom, *Chlamydia trachomatis*, klamydiainfektion.

Du har blivit smittad (eller misstänks ha blivit smittad) med klamydia. Klamydiainfektionen orsakas av en bakterie, som finns i urinröret och hos kvinnor även i slidan. De flesta har inga symptom av klamydiainfektionen och vet inte om att de är smittade.

Kvinnor kan få skador på äggledarna med risk för utomkvedshavandeskap och sterilitet. Män kan få bitestikelinflammation. Klamydia kan även orsaka ögoninfektioner.

Infektionen botas med antibiotika. Behandling av klamydia är kostnadsfri för patienten.

Klamydia kan överföras vid samlag (i slida eller ändtarm) och vid andra sexuella aktiviteter som t.ex. petting och munsex. Överföring kan också ske från mor till barn vid förlossningen.

Många har klamydia utan att veta om det och det kan leda till problem senare i livet. Därför är det viktigt att de som du haft samlag eller annan intim kontakt med och som kan ha smittat dig – eller som du kan ha smittat – blir smittspårade och kommer till läkare för undersökning och information. Full sekretess gäller vid smittspårningen och din identitet kommer inte att avslöjas för kontakterna.

Om provresultatet visar att du är smittad med klamydia, är du skyldig att medverka vid smittspårning.

För att förhindra att andra smittas måste du följa dessa förhållningsregler:

- *Om du har samlag eller annan intim kontakt innan du tagit hela antibiotikakuren eller det inte gått tio dagar sedan du påbörjade behandlingen, måste du innan ni har sex informera din partner om att du är smittad med klamydia. Ni måste då också använda kondom/femidom/slickklapp under hela samlaget/den intima kontakten.*
- *Du måste komma på de återbesök som din behandlande läkare anser nödvändiga.*

Sjukdomen du blivit smittad med är allmänfarlig enligt smittskyddslagen. Du är därför skyldig att följa de förhållningsregler din läkare ger. Om du begär det ska smittskyddsläkaren pröva förhållningsreglerna.